

Инструкция

по применению препарата ветеринарного «Гермивет»

1. Общие сведения.

1.1 Гермивет – Germivetum.

1.2 В 1,0 г препарата содержится 0,5 г пиперазина адипината и наполнитель (глюкоза).
Препарат представляет собой порошок белого цвета, без запаха.

1.3 Препарат выпускают в полимерной таре из полипропилена, или пакетах из ламинированной фольги, или в двойных пакетах из полиэтилена, или в пакетах полимерных из металлизированной полиэтиленовой пленки, или в пакетах для вакуумной упаковки по 0,05 кг; 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг и 1,0 кг.

1.4 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре не ниже +2⁰С и не выше +30⁰С.

1.5 Срок годности 4 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

2. Фармакологические свойства.

2.1 Препарат представляет собой антигельминтное средство.

2.2 Пиперазина адипинат входящий в состав препарата обладает активным действием против ряда нематод, возбудителей аскаридозов, оксиуроза, токсокароза, токсаскаридоза, пассалуриоза.

2.3 Механизм действия препарата основан на нарушении проведения нервных импульсов в ганглиозных клетках гельминта, что усиливает двигательную активность паразитов, а затем вызывает их паралич. Угнетает яйцеобразование аскарид. Препарат малотоксичен.

3. Порядок применения препарата.

3.1 Препарат назначают с лечебной целью при параскариозе (параскаридозе) и трихонематидозах лошадей, аскариозе (аскаридозе) свиней, токсокарозе, токсаскариозе (токсаскаридозе), унцинариозе и анкилостомозе собак и пушных зверей, аскариозе (аскаридозе) и гетеракидозе кур, пассалуриозе кроликов.

3.2 Лошадям препарат назначают внутрь из расчета 0,2 г/кг массы животного однократно. Свиньям при аскариозе назначают два раза в день, утром и вечером, без предварительного голодного режима групповым способом или индивидуально в разовых дозах: молодняку весом до 50 кг- 0,6 г/кг массы животного, свиньям весом свыше 50 кг- 30,0 г на животное.

3.3 Собакам и пушным зверям при токсокарозе, токсаскариозе, унцинариозе и анкилостомозе применяют без предварительного голодного режима и без последующего введения слабительного в разовой дозе 0,4 г/кг массы животного индивидуально трехкратно 3 дня подряд.

3.4 Курам препарат назначают в разовой дозе: цыплятам в возрасте от двух до трех месяцев 0,2 г, молодняку и взрослым курам 0,25 г на птицу в день два дня подряд. Дают с кормом групповым способом утром.

3.5 Кроликам назначают после 18-24 голодного режима индивидуально или групповым способом с кормом. С лечебной целью: в дозе 2,0 г/кг массы животного однократно или 2 дня подряд в разовой дозе 1,0 г/кг массы взрослым кроликам, а молодняку после отъема 2 дня подряд в разовой дозе 1,5г/кг массы животного. С профилактической целью применяют молодняку после отъема с кормом в дневной дозе 0,2-0,3 г/кг массы животного.

3.6 Препарат противопоказан кошкам.

3.7 При применении препарата может наблюдаться рвота, усиление перистальтики, понос, кратковременное нарушение координации движений.

3.8 При появлении побочных действий препарат отменяют и назначают атропина сульфат в терапевтических дозах.

3.9 Убой животных на мясо, которым применяли препарат, и использование яиц от кур, обработанных препаратом, в пищу людям разрешено без ограничения.

4. Меры личной профилактики.

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5. Порядок предъявления рекламаций.

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение Белорусский государственный ветеринарный центр (220005, г. Минск, ул Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6. Полное наименование изготовителя.

6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов». 210001, г. Витебск, ул.11-я Свердлова, 15.

Инструкция по применению препарата составлена заведующим кафедрой фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ», доцентом Толкачем Н.Г. и доцентом кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ» Петровым В.В..