

Инструкция

по применению мази прополисовой для ветеринарного применения

1. Общие сведения.

1.1. Unquentum Propolisi ad usum veterinarium.

1.2. Мазь прополисовая представляет собой однородную массу, сметанообразной консистенции светло-желтого или желтого цвета, со специфическим запахом.

1.3. В состав препарата входят: прополис, вазелин, ланолин и спирт.

1.4. Выпускают в стеклянных банках и таре из полимерных материалов емкостью 0,025-0,5 кг, закрытых полиэтиленовыми крышками.

1.5. Хранят в сухом, прохладном и защищенном от света месте. Срок хранения 12 месяцев.

2. Фармакологические свойства.

2.1. Мазь прополисовая обладает антимикробным, анестезирующим, противовоспалительным и стимулирующим регенерацию тканей действием.

3. Порядок применения препарата

3.1. Мазь прополисовую применяют для лечения животных с термическими ожогами, отморожениями, инфицированными ранами, дерматитами, при фурункулезе, гнойно-некротических процессах в области межкопытной щели и основе кожи копыта, а так же при акушерско-гинекологических болезнях (вагинитах, цервицитах, вульвитах), трещинах и ранах вымени.

3.2. Для лечения больных животных мазь прополисовую применяют в виде лекарственных повязок, аппликаций и тампонирований. На место поражения, после его туалета или хирургической обработки, накладывают марлевые салфетки, пропитанные мазью прополиса. Сверху накладывают фиксирующую повязку с гигроскопическим слоем (компрессная бумага или бумага). Смену повязок проводят через 2-3 дня.

3.3. При открытом методе лечения на раны царапины, трещины после тщательного их туалета наносят мазь прополисовую тонким слоем 2-3 раза в сутки. Раны, имеющие малое зияние, но глубокий канал, тампонируют марлевыми салфетками, пропитанными прополисовой мазью.

3.4. При лечении коров, больных вагинитами, вульвитами, цервицитами мазь прополисовую вводят в половые органы методом тампонации. Предварительно полость влагалища промывают физиологическим раствором. Замену тампонов проводят два раза в сутки (утром и вечером) ежедневно до выздоровления животного.

3.5. Применение мази прополисовой не вызывает осложнений и побочных эффектов. Противопоказаний к ее применению нет.

4. Меры личной профилактики

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5. Порядок предъявления рекламаций.

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19^а и изготовителю. Одновременно в ГУ Белгосветцентр высылают не менее трех невскрытых упаковок препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

6. Полное наименование изготовителя.

6.1. Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов»

Инструкция по применению мази прополисовой разработана сотрудниками УП «Витебский завод ветеринарных препаратов».