

Инструкция

по применению препарата порошок антисептический «Сульфформ»

А1. Общие сведения.

А1.1. Препарат порошок антисептический «Сульфформ» - Pulvis antisepticae «Sulfaformum»

А1.2. Состоит из 5,0 г ксероформа, 10,0 г стрептоцида и до 100,0 г талька.

А1.3. Препарат представляет собой мельчайший или мелкий порошок желтоватого цвета, не растворим в воде, со специфическим запахом без посторонних включений.

А1.3. Выпускают в полиэтиленовых пакетах по 0,05; 0,1; 0,2 и 0,5 кг или в полимерной таре по 0,1, 0,2, 0,5 и 1,0 кг.

А1.4. Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре не ниже +2⁰С и не выше +30⁰С.

А1.5. Срок годности 2 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

А2. Фармакологические свойства.

А2.1. Препарат порошок антисептический «Сульфформ» обладает противомикробными, подсушивающими, вяжущими, репеллентными и ранозаживляющими свойствами.

А2.2. Стрептоцид обладает антимикробным действием по отношению к стрептококкам, пневмококкам, кишечной палочке, клостридиям и др. Оказывает бактериостатическое а в высоких концентрациях бактерицидное действие.

А2.3. Ксероформ взаимодействуя с белком, образует альбуминаты. Действует дезинфицирующе, репеллентно, вяжуще и подсушивающее, ускоряет регенерацию и заживление ран. Малотоксичен, не раздражает раны и слизистые оболочки.

А2.4. Тальк оказывает адсорбирующее действие и является формообразующим средством.

А3. Порядок применения препарата.

А3.1. Препарат порошок антисептический «Сульфформ» используют наружно при мокнущих и инфицированных ранах, дерматитах, язвах, ожогах, и для обработки посткастрационных ран.

А3.2. Препарат наносят на поверхность поврежденного участка кожи 1-3 раза в день до выздоровления.

А3.3. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в рекомендуемых дозах не наблюдается, противопоказаний к его применению нет.

А3.4. При применении препарата убой животных на мясо не требует срока ожидания. Молоко используется на общих основаниях.

А4. Меры личной профилактики

А4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

А5. Порядок предъявления рекламаций.

А5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19^а и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают не менее трех невскрытых упаковок препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

А6. Полное наименование изготовителя.

А6.2. Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов»

Инструкция по применению лекарственного препарата порошок антисептический «Сульфформ» составлена содружниками УП «Витебский завод ветеринарных препаратов»