

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по применению настойки валерианы для ветеринарного применения**

#### **1. Общие сведения.**

1.1. Настойка валерианы для ветеринарного применения (Tinctura Valerianae ad usum veterinarium)

1.2. Настойка представляет собой вытяжку из корней валерианы на этиловом спирте. В 1 см<sup>3</sup> настойки содержится не менее 0,0005 г валериановой кислоты.

1.3. Настойка представляет собой жидкость, красно-бурого цвета специфического ароматно-спиртового запаха, допускается осадок.

1.4. Выпускают во флаконах из темного стекла по 50 см<sup>3</sup>, 100 см<sup>3</sup> и 500 см<sup>3</sup> или в полимерной таре по 100 см<sup>3</sup>, 200 см<sup>3</sup>, 500 см<sup>3</sup> и 1000 см<sup>3</sup>.

1.5. Настойку хранят в сухом, защищённом от света месте при температуре не ниже 10<sup>0</sup>С и не выше 25<sup>0</sup>С.

1.6. Срок годности 4 года с даты изготовления.

#### **2. Фармакологические свойства.**

2.1 Настойка валерианы в малых дозах обладает умеренным стимулирующим действием на дыхательную и сердечнососудистую системы, в терапевтических дозах успокаивающе действует на нервную систему; понижает тонус гладкой мускулатуры кишечника и сосудов.

#### **3. Показания к применению.**

3.1. Настойку валерианы применяют при вегетативных неврозах, при спазмалитических состояниях желудочно-кишечного тракта и коронарных сосудов, для понижения рефлекторной возбудимости, при гиперфункции щитовидной железы, как противострессовое средство.

3.2. Настойку валерианы применяют внутрь лошадям 20-50 мл; крупному рогатому скоту 75-100 мл; мелкому рогатому скоту 10-15 мл; свиньям 5-10 мл; собакам 2 –5 мл; курам 0,5-1,0 мл 2-3 раза в день в течение 1-2 дней. При коликах у лошадей настойку валерианы применяют в комбинации с ихтиолом и этиловым эфиром.

3.3. Противопоказаний к применению настойки валерианы не имеется.

#### **4. Меры личной профилактики.**

4.1. Настойка валерианы не токсична, не аллергенна, не вызывает побочных явлений.

4.2. Лица, контактирующие с препаратом, должны быть обеспечены спецодеждой.

4.3. При попадании препарата на кожу – смыть теплой водой с мылом.

## **5 Порядок предъявления рекламаций.**

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Белорусский государственный ветеринарный центр для подтверждения на соответствие нормативных документов.

## **6 Полное наименование производителя.**

6.1. Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов».

Наставление по применению настойки валерианы для ветеринарного применения разработано профессором кафедры внутренних незаразных болезней Абрамовым С.С. и ассистентом фармакологии и токсикологии Петровым В.В.