

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата порошок «Тритилосульф»
(Pulvis «Tritylosulfum»)

1. Общие сведения

- 1.1. Порошок «Тритилосульф» - Pulvis «Tritylosulfum»
- 1.2. Препарат порошок «Тритилосульф» представляет собой аморфный порошок белого или желтоватого цвета, слабоспецифического запаха, горького вкуса, не растворимый в воде.
- 1.3. В 1 грамме препарата содержится 0,3г сульфадимидина (сульфадимизина), 0,06г триметоприма, 0,125 г тилозина тартрата и наполнителя до 1,0 г.
- 1.4. Выпускают в пакетах из полиэтилена или полимерной таре по 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0 кг.
- 1.5. Препарат хранят в сухом, защищенном месте, при температуре от +5 до +25⁰С. Список Б.
- 1.6. Срок годности 2 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

2. Фармакологические свойства

- 2.1. Препарат порошок «Тритилосульф» обладает выраженной бактерицидной активностью против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, кокцидий, микоплазм, трепонем.
- 2.2. Препарат малотоксичен, в терапевтических дозах не оказывает побочных действий.

3. Порядок применения препарата

- 3.1. Препарат порошок «Тритилосульф» применяют при пневмониях, катаральной бронхопневмонии, бронхите, ларингите, ангине, сепсисе, некробактериозе овец и северных оленей, диспепсии, гастроэнтеритах, дизентерии поросят, инфекции мочевых путей, сальмонеллезе, пастереллезе, респираторном микоплазмозе, эймириозе птицы и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к компонентам препарата.
- 3.2. Всем видам молодняка сельскохозяйственных и мелким домашним животным препарат назначают внутрь в дозе 0,04 г/кг массы животного 2 раза в сутки с интервалом 12 часов с кормом, до выздоровления (на первый прием доза двукратная).
- 3.3. Птице назначают из расчета 1,0 г на 5 кг корма 2 раза в день с интервалом 12 часов до выздоровления.
- 3.4. Препарат порошок «Тритилосульф» противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности к его компонентам (сульфадимидин и триметоприм, тилозина тартрат) и козам.
- 3.5. Порошок «Тритилосульф» не совместим с новокаином и анестезином.
- 3.6. Не применять лактирующим животным.
- 3.7. Убой животных на мясо, а так же мясо и яйца птицы можно использовать в пищу людям через семь суток после последнего применения препарата.

4. Меры личной профилактики

- 4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5. Порядок предъявления рекламаций.

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19^а и изготовителю. Одновременно в ГУ Белгосветцентр высылают не менее трех невскрытых упаковок препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

6. Полное наименование изготовителя.

6.2. Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов»

Наставление по применению препарата порошок «Тритилосульф» разработано заведующим кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ», доцентом Толкачем Н.Г. и доцентом кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ», Петровым В.В.