

ИНСТРУКЦИЯ

по применению настойки валерианы для ветеринарного применения (Tinctura Valerianae ad usum veterinarium)

1. Общие сведения.

1.1. Настойка валерианы для ветеринарного применения (Tinctura Valerianae ad usum veterinarium)

1.2. Настойка представляет собой вытяжку из корней валерианы в соотношении 1:5 на этиловом спирте с объемной долей 70%.

1.3. Настойка представляет собой жидкость, красно-бурого цвета, специфического ароматно-спиртового запаха, сладковато-горького пряного вкуса. Допускается мелкодисперстный осадок легко разбивающийся при встряхивании.

1.4. Выпускают во флаконах по 50, 100 и 500 см³ или в полимерной таре по 100, 200, 500 и 1000 см³.

1.5. Настойку хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не ниже 10⁰С и не выше 25⁰С.

1.6. Срок годности 4 года с даты изготовления.

2. Фармакологические свойства.

2.1. Настойка валерианы в малых дозах обладает умеренным стимулирующим действием на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, в терапевтических дозах успокаивающе действует на нервную систему; понижает тонус гладкой мускулатуры кишечника и сосудов.

3. Показания к применению.

3.1. Настойку валерианы применяют при вегетативных неврозах, при спазмолитических состояниях желудочно-кишечного тракта и коронарных сосудов, для понижения рефлекторной возбудимости, при гиперфункции щитовидной железы, как противострессовое средство.

3.2. Настойку валерианы применяют внутрь лошадям 20-50 мл; крупному рогатому скоту 75-100 мл; мелкому рогатому скоту 10-15 мл; свиньям 5-10 мл; собакам 2 –5 мл; курам 0,5-1,0 мл 2-3 раза в день. При спазмолитических коликах у лошадей настойку валерианы применяют в комбинации с ихтиолом и этиловым эфиром.

3.3. Противопоказаний к применению настойки валерианы не имеется.

4. Меры личной профилактики.

4.1. Настойка валерианы не токсична, не аллергенна, не вызывает побочных явлений.

4.2. Лица, контактирующие с препаратом, должны быть обеспечены спецодеждой.

4.3. При попадании препарата на кожу – смыть теплой водой с мылом.

5 Порядок предъявления рекламаций.

5.1. В случае несоответствия препарата указанным в настоящем наставлении требованиям, а также при выявлении осложнений, использование препарата прекращают, сообщают об этом в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная 19-а, тел. 290-42-79). Одновременно направляют в адрес Белорусского государственного ветеринарного центра не менее 3-х невскрытых упаковок препарата из серии, вызвавшей осложнения.

6 Полное наименование производителя.

6.2. Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов».

Наставление по применению настойки валерианы для ветеринарного применения разработано профессором кафедры внутренних незаразных болезней Абрамовым С.С. и ассистентом фармакологии и токсикологии Петровым В.В.