

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного препарата «Доксиклат 20 %»

1 Общие сведения

- 1.1 Доксиклат 20 % - (Doxyklatum 20 %).
- 1.2 Препарат представляет собой порошок от светло-желтого до желтого цвета без посторонних примесей. В 1г. препарата содержится: 200 мг доксициклина гидрохлорида (гиклата) и вспомогательные вещества (декстроза моногидрат).
- 1.3 Препарат упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки или в полимерную тару по 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг; 1,0 кг; 2,0 кг; 3,0 кг; 5,0 кг.
- 1.4 Препарат хранят в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°C до плюс 25°C.
- 1.5 Срок годности 2 года со дня изготовления.

2 Фармакологические свойства

- 2.1 Доксициклин относится к полусинтетическим тетрациклинам. Нарушает синтез белка в клетках микроорганизмов на уровне рибосом.
- 2.2 Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий следующих видов: *Esherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Chlamydia* spp., *Rickettsia* spp., *Brucella* spp., а также микоплазм и некоторых простейших.
- 2.3 Достаточно хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Связывается с белками крови на 80-90 %. Хорошо растворяется в жирах и легко проникает в биологические жидкости. Большая часть выводится с фекалиями, около 40 % - с мочой.

3 Порядок применения

3.1 Препарат назначают лечения свиней при энзоотической пневмонии, плевропневмонии, атрофическом рините, сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии, лептоспирозе.

Птице назначают при лечении колибактериоза, пастереллеза, сальмонеллеза, микоплазмоза, стафилококкоза, смешанных инфекциях, инфекциях невыясненной этиологии, а также при бактериальных осложнениях вирусных инфекций.

3.2 Препарат назначают свиньям внутрь 1 раз в сутки в течение 3-5 дней; птице назначают перорально с водой в течение 3-5 дней. Водный раствор препарата должен быть единственным источником питья в течение всего периода лечения. Срок годности раствора 24 часа.

В дозах:

Препарат	Свиньи	Птица
Доксиклат 20 %	0,05-0,1 г/кг массы	0,5 кг на 1-2 т. воды

3.3 Применение препарата не оказывает побочного действия. Препарат не применяют: с кормом, содержащим молоко и молочные продукты; с лекарственными препаратами, содержащими соединения кальция, магния и алюминия. Не следует применять совместно с антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп.

3.4 Убой животных и птицы на мясо разрешен через 20 дней после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным животным или для производства мясокостной муки.

3.5 Препарат запрещен к применению продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

3.6 Препарат запрещен к применению птицам, чье яйцо используется в пищу людям.

4 Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение Белорусский государственный ветеринарный центр (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 Полное наименование производителя

6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов», РБ, г. Витебск, ул. 11- Свердлова, 15В, 210001.

Инструкция по применению препарата составлена сотрудниками УО ВГАВМ (Дубина И.Н., Криворучко Е.Б., Синковец А.В.).

