

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам

протокол от «13» декабря 2020 г № 112

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата ветеринарного «Окситетравет 500»

1. Общие сведения

- 1.1 Окситетравет 500 – (Oxytetravetum 500).
- 1.2 Препарат представляет собой порошок желтого цвета, однородный по окраске, без посторонних примесей. В 1,0 г препарата содержится 500,0 мг окситетрациклина гидрохлорида и наполнитель (декстроза).
- 1.3 Препарат выпускают в полимерной таре или в двойных пакетах из полиэтилена по 50,0 г; 100,0 г; 200,0 г; 500,0 г и 1000,0 г.
- 1.4 Препарат хранят в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до плюс 25 °С. Список Б.
- 1.5 Срок годности препарата 2 года с даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

2. Фармакологические свойства

- 2.1 Окситетрациклина гидрохлорид относится к группе биосинтетических противомикробных средств из группы тетрациклинов, обладающих широким спектром действия.
- 2.2 Высокоэффективен против грамотрицательных и грамположительных бактерий следующих видов микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Chlamydia* spp., *Rickettsia* spp., *Brucella* spp., *Mycoplasma* spp., *Paenibacillus larvae*, а также эймерий, актиномицетов и некоторых простейших.
- 2.3 Механизм действия препарата заключается в ингибировании синтеза белка микроорганизмов на рибосомах, вызывая бактериостатическое действие.
- 2.4 Окситетрациклина гидрохлорид хорошо проникает в органы, ткани и жидкости организма, проявляя высокое терапевтическое действие.

3. Порядок применения

- 3.1 Окситетравет 500 назначают с лечебной целью молодняку крупного рогатого скота, свиньям и птице при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе, риккетсиозе, стафилококковой инфекции и других заболеваниях, вызванных чувствительными к тетрациклинам микроорганизмами. Показан для применения пчелам при гнильцовых болезнях.
- 3.2 Препарат назначают orally в смеси с кормом или водой в течение 3-5 дней. Крупному рогатому скоту 20-40 мг/кг массы тела, свиньям 30-60 мг/кг массы тела 2 раза в сутки до выздоровления. Курам, индейкам и уткам 40-100 мг/кг массы тела 2 раза в сутки до выздоровления или выпаивают с водой из расчета 25 г на 5 литров воды до выздоровления.
- 3.3 Окситетравет 500 для лечения пчел при гнильцовых болезнях применяют весной до начала массового медосбора или летом после откачки товарного меда. Перед лечением больные семьи перемещают в чистые продезинфицированные ульи, производят замену маток на здоровых плодных.
- Ранней весной препарат скармливают пчелам с канди или сахарным сиропом. В теплое время пчел опрыскивают лечебным раствором непосредственно по соторамкам из расчета 2,0 г препарата на одну пчелосемью силой 8-10 улочек.
- Приготовление лечебного канди: препарат вносят в медово-сахарное тесто (канди) из расчета 20-25 г препарата на 5 кг канди и скармливают пчелам по 0,5 кг на семью пчел.
- Приготовление лечебного сиропа: 20-25 г препарата вносят в 100 мл теплой воды, а затем смешивают с 10 л сахарного сиропа (1:1) и скармливают пчелам в чистых кормушках из расчета 100 мл на 1 рамку с пчелами.

Приготовление лечебного раствора: 20-25 г препарата растворяют сначала в небольшом количестве теплой воды, а затем вносят в 1,5 л теплого сахарного сиропа (1:5) и равномерно опрыскивают соторамки с пчелами из расчета 10-15 мл на 1 рамку. Опрыскивание проводят тщательно с обеих сторон (зоны размещения пораженного расплода смачивают с особой тщательностью).

С лечебной целью обработки проводят трехкратно через 6-7 дней. Одновременно с лечением проводят дезинфекцию ульев, сотов и рабочего инвентаря согласно инструкции по дезинфекции на пасаках. Подмор и ульевого мусора сжигают.

3.4 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений. При применении препарата в повышенных дозах возможен дисбактериоз.

3.5 Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллина, полимиксина и препаратами, содержащими соединения кальция, алюминия и магния. Не использовать для лечения животных с дистрофическими поражениями печени и при повышенной чувствительности к данной группе антибиотиков. Препарат не назначают курам-несушкам.

3.6 При возникновении аллергических реакций препарат отменить, назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.7 Убой животных и птицы на мясо разрешен через 20 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным животным. Мед используют без ограничений.

4. Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.




5. Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение Белорусский государственный ветеринарный центр (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6. Полное наименование производителя

6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов», 210001, г. Витебск, ул. 11-я Свердлова, 15В.

Инструкция по применению разработана сотрудниками УО ВГАВМ: заведующим кафедрой фармакологии и токсикологии УО ВГАВМ, доцентом Толкачем Н.Г., доцентом кафедры фармакологии и токсикологии УО ВГАВМ Петровым В.В., ассистентом кафедры внутренних незаразных болезней животных УО ВГАВМ Ивановым В.Н., заведующим кафедрой болезней мелких животных и птиц УО ВГАВМ Герасимчиком В.А. и Дунец Е.Н.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
23	12 2020 протокол № 112