

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению препарата ветеринарного «Мазь ихтиоловая 10%»**

**1 Общие сведения**

- 1.1 Мазь ихтиоловая 10% (Unguentum Ichthyoli 10%).
- 1.2 Лекарственная форма: мазь.
- 1.3 Мазь ихтиоловая 10% представляет собой густую однородную массу от коричневого до тёмно-бурового цвета с запахом ихтиола.
- 1.4 Состав: ихтиол ветеринарный, вазелин. В 100 г мази содержится 0,75 г серы.
- 1.5 Мазь выпускают в полимерной таре по 0,1; 0,2; 0,5; 0,8 и 1,0 кг.
- 1.6 Мазь хранят в сухом, защищённом от света месте при температуре от 0 °C до плюс 25 °C.
- 1.7 Срок годности: 2 года со дня изготовления. Не применять по истечении срока годности препарата.

**2 Фармакологические свойства**

- 2.1 Мазь ихтиоловая 10% оказывает антисептическое, противовоспалительное действие.
- 2.2 При нанесении на раны мазь ихтиоловая 10% суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани.

**3 Порядок применения**

- 3.1 Мазь ихтиоловую 10% применяют при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты, фурункулез, пиодермии), артритах, невралгиях, тендинитах, тендовагинитах, бурситах, мастите.  
3.2 Мазь наносят наружно тонким слоем на пораженную поверхность 1-2 раза в сутки до полного клинического выздоровления. При необходимости используют повязку. Перед применением мази проводят антисептическую и хирургическую обработку, рану очищают от гнойно-некротических масс, так как наличие гноя снижает эффективность лечения.  
При мастите мазь наносят ежедневно 2 раза в сутки тонким слоем на кожу вымени с последующим ее втиранием. Продолжительность лечения составляет 3-4 дня.  
При лечении животных с асептическими бурситами применяют мазь 2 раза в сутки методом втирания до клинического выздоровления. При гнойных бурситах применяют мазь в виде активных дренажей 1-2 раза в сутки до клинического выздоровления.
- 3.3 Побочных явлений и осложнений при применении мази не установлено. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная чувствительность животного к ихтиолу. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и появлении признаков аллергических реакций применение мази прекращают, препарат удаляют с поверхности и назначают антигистаминные средства.
- 3.4 Убой животных на мясо после применения мази ихтиоловой 10% разрешен без ограничений. Молоко, полученное от животных, подвергавшихся лечению мазью, можно использовать для пищевых целей без ограничений.

**4 Меры профилактики**

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности.

**5 Порядок предъявления рекламаций**

- 5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение

«Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

## 6 Полное наименование изготовителя.

6.1 Унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов», 210001, г. Витебск, ул. 11-я Свердлова, 15В.

Инструкция подготовлена сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины В.М. Руколем, Е.Г. Андреевой, А.А. Гарбузовым, Е.А. Юшковским.

